

# 登革熱 防治



# 認識登革熱

## 俗稱

- 俗稱「**天狗熱**」或「**斷骨熱**」

屬於：  
急性病毒性傳染病

## 感染

- 最常見是被帶病毒的**病媒蚊叮咬**而感染  
( **病媒蚊**: 埃及斑蚊或白線斑蚊 )

## 防治

- 最有效的防治方法：  
落實孳生源**清除與管理**，必要時輔以化學防治措施

# 傳染途徑

## 主要傳染途徑



病媒蚊叮咬

第一種



母嬰垂直感染

第二種

有疑似登革熱症狀，  
建議**暫緩捐血**，降低  
他人經輸血感染風險



血液或性行為感染

第三種


# 登革熱之病媒蚊

## 埃及斑蚊



喜歡棲息在**室內**

## 背面花紋 差異




## 白線斑蚊



喜歡棲息在**室外**

# 登革熱的傳播循環：人-蚊-人循環

病媒蚊叮咬  
已感染登革熱  
的人類



帶有登革熱病毒  
之病媒蚊

感染登革熱



未染疫的人  
被帶有病毒的  
病媒蚊叮咬



# 蚊子叮咬，不是小事？

## 一般症狀



## 警示徵象



出現上述症狀，你可能感染**登革熱**，速就醫！



衛生福利部疾病管制署 TAIWAN CDC



www.cdc.gov.tw



1922防疫達人

# 如有疑似症狀，請儘速就醫！



**典型症狀**：突發高燒與以下至少 2 項症狀：

#頭痛

#後眼窩痛

#出疹

#噁心、嘔吐

#肌肉痛、關節痛、骨頭痛

#任一警示症狀



**警示症狀**：

#腹痛

#容易嗜睡

#躁動不安

#持續嘔吐


#胸水、腹水

#出血（如流鼻血、吐血、咳血）

# 防治措施

## 預防蚊蟲叮咬

- 穿著淺色長袖衣褲
- 身體裸露部位塗抹政府主管機關核可的防蚊藥劑：



- 含有DEET ( 敵避 ) 、
  - 含有picaridin ( 派卡瑞丁 )
  - 含有IR3535 ( 伊默克 )
- 皆可有效達到防蚊效果



- ◆ 使用前**閱讀**產品使用**說明書**的說明及注意事項
- ◆ 注意是否可直接噴灑於皮膚

### 若要同時使用防曬產品：

- DEET成份會減少防曬效果
- 防曬乳液可能增加DEET之皮膚吸收
- **建議先使用防曬產品，15分鐘後再使用防蚊產品** (疾管署與環境部建議)

### ◆ 旅遊防疫：

- ✓ 出國前了解**當地疫情**
- ✓ 旅遊時**防蚊叮咬**
- ✓ **返國14天內**多留意有無出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛等不適
- ✓ 如有症狀，儘速就醫，並告知旅遊史與活動史

### ◆ 環境防疫：

- ✓ 積極參與社區動員防疫
- ✓ 主動進行**孳生源清除**

# 防治措施

## 了解與清除可能的孳生源


### 認識「病媒蚊生活史」




卵



幼蟲(孑孓)



蛹



成蟲

- ◆ 幼蟲及蛹所**生長的环境**，就是**病媒蚊孳生源**
- ◆ 登革熱病媒蚊生活習性為**水棲**，故**積水容器**會成為孳生源

# 防治措施 - 清除孳生源



盆栽或盆底積水



水桶或花灑積水

**巡**視積水容器



**巡**

**倒**

**倒**掉積水

**清**除不必要容器



廢棄輪胎、空瓶

**清**

**刷**

**刷**除蟲卵



戶外帆布積水

# 生活環境的潛在登革熱孳生源: 巡、倒、清、刷



寵物籠內飲水槽



積水浴缸



菜園中的水桶



未蓋的馬桶水箱



烘碗機水槽積水



防火巷內廢棄水錶



保麗龍箱積水



遮雨棚積水



戶外防空壕



地下室水槽

# ~~防治登革熱，大家一起來~~



環境定期清除  
孳生源



已感染者需進行  
自主健康管理



有疑似症狀  
儘快就醫

製作單位：教育部  
編輯單位：國立臺灣大學  
諮詢單位：衛生福利部疾病管制署

